โรงพยาบาลพิมาย
Phimai hospital

ปรับปรุง ณ วันที่ 27 ก.พ. 2566

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับยา โซน 3 จังหวัดนครราชสีมา

แพทย์เขียนใบ Refer ผู้ป่วย

พิจารณาตามกลุ่มยาที่ใช้

- ยา NCD
- Antibiotics
- Proluton inj. และยาอื่นๆ

พยาบาลหน้าห้องตรวจส่งมอบใบ Refer ให้ผู้ป่วย

บันทึกข้อมูลใน HOSxP และ R9Refer

แจ้งศูนย์ Refer

ข้อมูลจาก HOSxP จะประมวลผลเข้า R9Refer อัตโนมัติ

กรณีสั่งใช้ Proluton inj. ต้องโทรประสานงานศูนย์ Refer

ศูนย์ Refer โทรแจ้ง รพ.ลูกข่าย เพื่อประสานเบิกยาต่อไป

เภสัชกร ตรวจสอบและจ่ายยา **แจ้งให้ผู้ป่วยนำเอกสารไปติดต่อ รพ.ลูกข่าย ทันที*

ยา NCD	Antibiotics	Proluton inj. และยาอื่นๆ
จ่ายยาสำหรับ **15 วัน** กรณี **ไม่มียาในบัญชี** สามารถ 1. ปรับยาตามบัญชียา รพ. 2. ขอสนับสนุนยา	กรณี รพ.ลูกข่าย **มียาในบัญชี** --> **ไม่จ่ายยา** กรณี รพ.ลูกข่าย **ไม่มียาในบัญชี** --> จ่ายยาตามแผนการรักษา **** ไม่เกิน 14 วัน**	**ไม่จ่ายยากลับบ้าน** แนะนำผู้ป่วยนำใบ refer ไป ติดต่อ รพ.ลูกข่าย ทันที

เภสัชกรแนบใบสรุปรายการยา D/C
- ระบุ plan of treatment
(วันที่ Start – Off ยา)