

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566**

- มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 89 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	5	5	0	0	306	27,846.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	1	1	0	0	9	6,750.00
Ertapenem 1 g/vial	4	3	1	0	27	30,861.00
Meropenem inj. 1 g/vial	34	34	0	0	519	82,521.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	3	3	0	0	21	4,221.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	12	12	0	0	62	27,404.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	26	26	0	0	552	52,164.00
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	3	3	0	0	139	12,441.00
Cefoxitin 1 g	1	1	0	0	114	14,022.00
รวม	89	88	1	0	-	258,230.00
ร้อยละ	-	98.87	1.14	0	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 98.87
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 98.87
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.14
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 0.00
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 258,230.00 บาท

### การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์

1. pt. เพศชาย HN 0051388 Diagnosis: Multiple Abscess of Buttock แพทย์สั่งใช้ยา Ertapenem 1 g IV OD\*7 days  
Scr= 1.06, eGFR 100 แพทย์สั่งใช้ยาโดยไม่มีการสั่งตรวจ H/C