

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 90 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	3	3	-	-	469	42,679.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	4	4	-	-	132	99,000.00
Ertapenem 1 g/vial	8	8	-	-	61	69,723.00
Meropenem inj. 1 g/vial	30	30	-	-	583	92,697.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	3	3	-	-	37	7,437.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	15	14	1	-	74	32,708.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	23	23	-	-	462	43,659.00
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	4	4	-	-	58	5,191.00
รวม	90	89				393,094.00
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 98.89
 - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.11
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ -
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ -
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 393,094.00บาท

การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์

1. HN 59622 เพศชาย อายุ 74 ปี Dx: Pneumonia, AKI Scr 1.43, eGFR 48 แพทย์สั่งใช้ยา Levofloxacin 750 mg IV OD