

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา**  
**ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566**

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 140 ราย ดังนี้

| รายการยา                              | ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases) | ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |                            |                                       | ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative) |                |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
|                                       |                               | การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)  | การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย) | การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย) | ปริมาณยาที่ใช้ (vials)                   | มูลค่ายา (บาท) |
| Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial | 3                             | 3                                 | -                          | -                                     | 123                                      | 48,006.00      |
| Imipenem inj. 0.5 g/vial              | 6                             | 6                                 | -                          | -                                     | 187                                      | 140,250.00     |
| Ertapenem 1 g/vial                    | 8                             | 8                                 | -                          | -                                     | 42                                       | 48,006.00      |
| Meropenem inj. 1 g/vial               | 47                            | 47                                | -                          | -                                     | 1,010                                    | 160,590.00     |
| Colistin sodium inj. 0.15 g/vial      | 4                             | 4                                 | -                          | -                                     | 43                                       | 8,643.00       |
| Levofloxacin inj. 0.75 g/vial         | 21                            | 21                                | -                          | -                                     | 123                                      | 54,366.00      |
| Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial    | 44                            | 44                                | -                          | -                                     | 1,078                                    | 101,871.00     |
| Vancomycin inj. 0.5 g/vial            | 6                             | 6                                 | -                          | -                                     | 130                                      | 11,635.00      |
| Cefoxitin 1 g                         | 1                             | 1                                 | -                          | -                                     | 43                                       | 8,643.00       |
| รวม                                   | 140                           | 140                               | 0                          | 0                                     | -  |                |
| ร้อยละ                                | -                             | 100                               | 0                          | 0                                     | -  | 582,010.00     |

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ -
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ -
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 582,010.00 บาท