



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๐๐๓๓.๒๐๔.๑๙/๐๐๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายการยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน แพทย์ทุกท่านและคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

เนื่องด้วยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลพิมาย ได้พิจารณารายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลพิมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ เรียบร้อยแล้ว งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและมียาเพื่อใช้ในงานบริการเภสัชกรรม ดังนี้

ลำดับ	รายการยา	บัญชียา	ราคา	เงื่อนไข	แบบประเมินการ ใช้ยา (DUE)
1	Sodium hyaluronate 20 mg/2 ml intra-articular injection	NED	1,667.42 บาท/syringe	แพทย์ออร์โธปิดิกส์เป็นผู้อนุมัติสั่งใช้	มีใบ DUE
2	Three-In-One Parenteral nutrition 1,448 ml สูตร SmofKabiven® peripheral	ง	1,005.80 บาท/ถุง	ศัลยแพทย์หรืออายุรแพทย์ เป็นผู้อนุมัติสั่งใช้	-

ขณะนี้มียาพร้อมใช้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิษณุ ท้าวหาญ)

ประธานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

(นายนพชัย ประสงค์สุธน)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

การเตรียมอาหารทาง หลอดเลือดดำ

“SMOFKABIVEN”



1. ถึงถุงในแนวนอน ฉีกบริเวณรอยบากที่ใกล้กับ Port ตามแนวขอบถุงด้านบน

***** หากฉีกถุงด้านบนออกแล้ว ควรบีบผสมทันที ไม่แนะนำให้ฉีกถุงทิ้งไว้*****



2. ดึงถุงพลาสติกหุ้มภายนอกออกตามแนวความยาวของถุงจนหมด ทิ้งพลาสติกหุ้มภายนอกและสารดูดซับออกซิเจน



3. ม้วนถุงยาลงมาจากด้านที่หัวของถุงยา โดยเริ่มจากมือขวา แล้วใช้มือซ้ายม้วนตามลงมา เพื่อให้เกิดแรงดันจากของเหลวภายในจนทำให้รอยเชื่อมถุงตามแนวตั้งแยกจากกัน



4. ผสมของเหลวใน 3 ช่องให้เข้ากัน โดยการพลิกถุงกลับไป-มา จนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี

อายุของยาหลังการผสม

ยามีความคงตัวหลังจากผสมแล้วในถุงแบบ 3 ช่อง ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
***** ห้ามแช่แข็ง*****

ข้อห้ามใช้ยา

1. ภาวะไขมันในเลือดสูงรุนแรง
2. ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
3. โรคไตเรื้อรัง แต่ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
4. ภาวะช็อกเฉียบพลัน
5. ทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี



สแกนคิวอาร์โค้ดดูวิธีการเตรียม
Smofkabiven ได้ที่นี่