

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 105 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	5	5	-	-	646	58,786.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	2	2	-	-	65	48,750.00
Ertapenem 1 g/vial	8	8	-	-	77	88,011.00
Meropenem inj. 1 g/vial	32	32	-	-	725	115,275.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	2	2	-	-	28	5,628.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	13	13	-	-	59	26,078.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	38	38	-	-	851	80,419.00
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	5	5	-	-	64	5,728.00
รวม	105	105	-	-	-	428,675.00
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ -
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ -
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 428,675.00 บาท