

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา**  
**ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567**

- มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 103 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	3	3	-	-	225	20,475.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	3	3	-	-	184	138,000.00
Ertapenem 1 g/vial	11	10	1	-	70	80,070.00
Meropenem inj. 1 g/vial	39	39	-	-	730	116,070.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	3	3	-	-	54	10,854.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	15	15	-	-	78	34,476.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	29	29	-	-	518	48,951.00
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	-	-	-	-	-	-
รวม	103	102	1	-1	-	448,896.00
ร้อยละ	-	99.03	0.97	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 99.03
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 99.03
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.97
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 0.00
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 448,896.00 บาท

### การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์

1. HN 42456 เพศชาย อายุ 84 ปี DX: UTI E. Coli ESCR Scr 1.86, eGFR 34 แพทย์สั่งใช้ยา Ertapenem 1 g IV OD (-ขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยรายนี้ คือ Ertapenem 500 mg IV q 24 hr)