

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 121 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	1	1	-	-	60	5,460.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	6	6	-	-	208	156,000.00
Ertapenem 1 g/vial	13	13	-	-	75	85,725.00
Meropenem inj. 1 g/vial	40	40	-	-	727	115,593.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	3	3	-	-	38	7,638.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	23	23	-	-	162	71,604.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	31	31	-	-	859	81,175.50
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	4	4	-	-	86	7,697.00
รวม	121	121	-	-	-	530,892.50
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 0.00
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 530,892.50 บาท