



ประกาศโรงพยาบาลพิมาย
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลพิมาย
(Antimicrobial Resistance : AMR)

เพื่อให้การบริหารจัดการ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างระมัดระวัง และอย่างมีความรับผิดชอบ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ในการป้องกันและรักษาภาวะติดเชื้ออย่างเหมาะสมที่สุดจากการใช้ยาต้านจุลชีพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จำเป็น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การใช้ยาต้านจุลชีพกรณีไม่ทราบผลเพาะเชื้อ (empiric therapy) ให้อิงตามผล Antibiogram ของโรงพยาบาลพิมาย
๒. การสั่งยาต้านจุลชีพที่ควบคุม (Controlled Antibiotics) แบบฉีด ๙ รายการ ได้แก่ Ertapenem, Meropenem, Imipenem/Cilastatin, Levofloxacin, Cefoperazone/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Vancomycin, Colistin และ Cefoxitin ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

๒.๑ แพทย์เฉพาะทางสั่งยาแบบ Empiric Therapy ได้ใน ๓ วันแรก (แพทย์เพิ่มพูนทักษะสั่งใช้ยาภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง) และส่งเพาะเชื้อทุกครั้ง หลังจาก ๓ วันแรกหรือเมื่อผลเพาะเชื้อออก ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาต่อ แพทย์เขียนใบ “แบบอนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลพิมาย (DUE) * เกสซ์กรจะจ่ายยาเมื่อมีใบ DUE

๒.๒ กรณีผลเพาะเชื้อ “พบเชื้อ” ขอความร่วมมือแพทย์ De-escalate ยาที่ผลเพาะเชื้อขึ้นภายในระยะเวลา ๕ วัน

๒.๓ กรณีผลเพาะเชื้อ “ไม่พบเชื้อ” ถ้าผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกดี ขอความร่วมมือแพทย์ De-escalate ยา

๒.๔ ยา Controlled Antibiotics แบบฉีด ๙ รายการ สั่งใช้ได้ไม่เกิน ๑๔ วัน หากผู้ป่วยมี อาการทางคลินิกไม่ดีขึ้น หรือมีผลเพาะเชื้อที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อ ให้แพทย์ประเมินและสั่งใช้ยาใหม่โดยเขียนใบ “แบบอนุมัติใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลพิมาย (DUE)”

๓. กำหนดให้ยา Oseltamivir และ Azithromycin ชนิดรับประทานเป็นยา Controlled Antibiotics กรณีแพทย์ไม่ระบุจำนวนวันการให้ยา เมื่อครบ ๕ วัน จะหยุดคำสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอัตโนมัติ (Antibiotic automatic stop order)

๔. กรณีการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอกที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับ ๒ กลุ่มโรคให้พิจารณารักษาตามอาการเป็นอันดับแรก หรือใช้ยาสมุนไพรทางเลือก ดังนี้

๔.๑ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory tract infection; URI) : ยาฟ้าทะลายโจร บรรเทาอาการหวัดเจ็บคอ รับประทานครั้งละ ๑.๕ - ๓ กรัม วันละ ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน

๔.๒ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) : ยาฟ้าทะลายโจร บรรเทาอาการท้องเสีย รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๒ กรัม วันละ ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๓ วัน

ผู้รับผิดชอบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลและการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (AMR), คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) และคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรักเกียรติ ประสงค์ดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย