

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 122 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีคำสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
Ertapenem inj 1 g/vial	5	5	0	0	33	1086	35,838.00
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	4	4	0	0	95	151	14,345.00
Meropenem inj 1 g/vial	48	47	0	1	977	116	113,332.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	7	7	0	0	47	218	10,246.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	1	1	0	0	87	29.5	2,566.50
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	51	51	0	0	1071	80	85,680.00
Colistin inj 150 mg/vial	1	1	0	0	6	128	768.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	4	4	0	0	95	51.5	4,892.50
Fosfomycin 2 g inj.	1	1	0	0	132	294	38,808.00
รวม	122	0	1	0	2543		306,476.00
ร้อยละ		99.18					

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 99.18
- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0
- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0.82

HN xxxxxx มีค่า GFR=23 แพทย์สั่งใช้ Meropenem 1 g IV q 8 hr ซึ่งขนาดยาที่แนะนำคือ 500 mg IV q 12 hr

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

306,476.00 บาท